5° année

N° 117 bis

29 avril 1953



22, rue de Brest — LYON Téléphone : FRanklin 82-51

## BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

RHONE-ALPES

Bimensuel

Compte chèques postaux Lyon 2168-43 - Fédération des Groupements de Défense, 7, place Ampère - L Y O N

## VIGNE

(A) MILDIOU: Les pluies orageuses qui se sont produites dans certains points de la région ont favorisé la maturation des œufs d'hiver. Le premier traitement contre la formation des foyers primaires du Mildiou de la vigne devra être appliqué dès réception, dans les seules vignes où ont été observées en automne 1952 des attaques tardives importantes, des régions suivantes:

Ardèche: 141 - 146 - 148.

Loire: 1 - 6 - 7 - 8.

Rhône: 27 - 28 - 29 - 32 - 34 - 35.

Ain: 45 - 46 - 47 - 52.

Haute-Savoie: 62 - 66 - 67 - 72 - 73.

Savoie: 81 - 82 - 83 - 84 - 87 - 88 - 89.

Isère: 106 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120.

Drôme: 122 - 123 - 124 - 125 - 128 - 129 - 134.

Dans les autres régions, traiter avant le 5 mai.

Bouillie bordelaise ou bourguignonne, sulfate basique, oxychlorures, oxydes cuivreux, acétates (Verdet), sont également efficaces contre cette maladie. Les nouveaux fongicides de synthèse, en particulier le S.R. 406, pourront également être utilisés sous les réserves précisées dans les «Bulletins» précédents.

(I) ERINOSE: Les petites cloques garnies d'un duvet feutré à la face inférieure de la vigne ont déjà fait leur apparition; elles sont violemment colorées sur les cépages noirs. Afin d'éviter la propagation de cet acarien sur la fleur où il pourrait produire des dégâts assez graves, dans les **vignes** où il est déjà **apparu** cette année, on appliquera seul ou, suivant les cas, en mélange avec le fongicide, un **soufre** micronisé mouillable à raison de 500 gr. pour 100 l. de bouillie.

## CONCOURS

## DÉTECTION DES FOYERS PRIMAIRES DU MILDIOU

Comme en 1952, la Station organise parmi les abonnés et toutes les personnes qui pourront en avoir connaissance un concours de détection des foyers primaires du Mildiou.

Les échantillons de feuilles que ces personnes soupçonneront être atteintes du Mildiou devront être envoyés à la Station le jour même ou le lendemain matin, au plus tard, de leur récolte, accompagnés de l'indication exacte du lieu de récolte, de la situation de ce lieu par rapport au reste de la propriété et du nom ou numéro du cépage.

Des abonnements d'un an à notre « Bulletin » ou le prolongement d'un an de l'abonnement en cours récompenseront les 3 premières personnes de chaque région naturelle dont l'envoi aura été reconnu atteint de taches primaires du Mildiou.

Le Contrôleur

chargé des Avertissements agricoles:

P. LATARD.

L'Inspecteur

de la Protection des Végétaux:

A. PITHIOUD.